

Clarithromicina

- **Antibiótico macrólido** especialmente indicado en **caninos, felinos y equinos**.
- Una de sus principales indicaciones son las infecciones respiratorias causadas por cocos aerobios, gram positivos y bacterias gram negativas como ***Haemophilus influenzae*, *Pasteurella multocida*, *Legionella pneumophila***, entre otras.

- Util en infecciones por Bordetella en pequeñas especies.
- Especialmente indicada en infecciones por ***Mycoplasmas spp.***
- Util también en infecciones por ***toxoplasma gondii*, *Helicobacter pylori*** y ***Cryptosporidium parvum***

- Disponible en tabletas o en suspensión oral.
- Indicada principalmente en infecciones respiratorias en **caninos y felinos**.
- Recomendada en infecciones por ***Rhodococcus equi*** en **potros**.
- Su acción se basa en la unión a la sub unidad 50 s ribosomal inhibiendo así la síntesis proteica.
- **Bacteriostático**.
- La experiencia clínica ha demostrado efectos adversos tales como vómito, diarrea y dolor abdominal
- No debe ser utilizada en especies productivas por el riesgo de residuos que promuevan resistencias en seres humanos.

Dosis en Perros: 2,5-10 mg/Kg oral, cada 12 horas

Dosis en Equinos: 7,5 mg/Kg oral cada 12 horas

Duración a criterio del médico veterinario